Lindard miteria dinaminatinalimitahaihimitanalimitahaihimitanalimitahaihimitanalimitahaihimita Fontanara 0Mtp385 Vass7R13s571-575 Collection Vassal-Montpellier Fontanara 10 R8 5-326.330







+2

luntridanti adam

ANNEE: 1993 NOM Fortanasa. EMPLACEMENT 10 R8 0 -326,330 ALL 8.88 Nbre Débourrement Nbre Ferti-Floraison ouche Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin mi/v fin Maturité début 16.3 183 " 1 2 18.3 16.3 3 Grappe : G - M - @ Dim :11 Compacité : L - M- C Pour : Mill :0 4 Baie: TG - G - M-P Dim: 183 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : (B)Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc - coloré Saveur : S-m-ar-fox-herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

ANUEL: 1994												
MCM Fontanara EMPLACEMENT LO R8 A 326, 330												
n.e. 8.88. ~i												
ouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti- lité	Floraison début mi/f			Véraison début mi/v fin		Maturit é	
1 %	3	10: -3	14.3.	. 7	TL18 TC14	16.5	19,5	22,5	19.7	22.7	25.7	16 8
7/3 4	2	73	do3,	TL18 16.5 19.5 225 19.1 22.7 25.7 16.8 TC14								
TL5	9	3,3	73 <	17								
	J & 1	lo .3.	94(+3)		Couleur: (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: (S) - m - ar - fox - herb Périns: avec - apyrène Port: Vigueur: 3,5							

Junturduntindunumbasambas

N° d'ordre : Désignation :

luntum lunti

Fontanara 10 R8 1.326.330 s.1

doutooleekuduutoolootool

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/18) - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196) - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.)

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212) - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 /- séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 2/331

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Cho91

N° d'ordre :

Juntandanti

Désignation :

Fontanara 10 R8 p. 326.330 p. 3

dontordarizatantanlariad

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtele. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue. : coloré 264 - vert 265.

Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 90

Fontanara 10 RB s. 326.330 s. 3

Désignation : Emplacement :

N° d'ordre :

Juntarilanti

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 263.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 2/5

do atendreste aleatan landard

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 1 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161,

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 67 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiel ement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

· Calvo 92

Fontanara

N° d'ordre :

Juntum Innti

Désignation :

10 R8 9-326.330 A.5

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite (0) (dimensions :12x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 15 x 14). De couleur blanc 87 / gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 + non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 / coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1. A saveur neutre 1(2) fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121, A pédicelle de couleur : verte 162 / rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125/- rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 / peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131)- long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 1β4. A peau fine 1/35) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 91

DENOMINATION :

Juntingluntia

10 R8A. 326.330 A.1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

procéis (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) alarge (2).

: saillant (1) = efface(2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 1-8-9 L_1/L : 10 - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - (15) - 16 Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (27) : 40 - (41) Dents : forme : 42 - (43) - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): (48 - 49 - 50) Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 59 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 : 60 - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

± 1 Juntunlande

Désignation: toutanara

Emplacement: NO R8 x 326.330

Ho d'ordre :

Remad 92